

Динамика и структура смертности от случайных отравлений алкоголем в Белоруссии

Научный руководитель – Соколов Александр Сергеевич

Говорушко Стас Александрович

Студент (бакалавр)

Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины, Геолого-географический факультет, Гомель, Беларусь
E-mail: govor6584515@mail.ru

По данным Всемирной организации здравоохранения [3] за последние годы произошло значительное снижение потребления алкоголя. Так, в 2016 году по сравнению с 2010 количество потреблённого чистого алкоголя на душу населения (более 15 лет), снизилось с 17,5 (1-е место в мире) до 11,2 (27-е место) литра в год. В том числе среди мужчин с 28,9 до 18,0 (26-е место) литра, среди женщин с 7,9 до 5,5 (9-е место) литра в год. Тем не менее, социальные последствия, вызванные употреблением психоактивных веществ, продолжают оставаться крайне актуальной проблемой.

Резкий рост отравлений алкоголем начался с 1990 года и достиг пика в 2004 году (30,7 случаев на 100 000 человек), затем постепенно эта величина стала уменьшаться, достигнув минимума в 2015 году (14,7 случаев), а с 2015 вновь стала возрастать, достигнув в 2019 году 17,2 случая (рис. 1).

Смертность в трудоспособном возрасте превышает смертность для всего населения на 5-6 случаев на 100 000 населения [1]. Так, в 2019 году среди всех лиц трудоспособного возраста удельная смертность составила 22,4 случая. Смертность мужчин (29,6) в 4,8 раза превышает смертность женщин (6,2), а среди трудоспособного возраста - в 6,3 раза (соответственно, 37,2 и 5,9 случая). Заметно, что, в отличие от мужчин, для женщин смертность от отравлений алкоголем в трудоспособном возрасте ниже, чем в целом по населению.

Смертность среди сельского населения (29,5) в 2,2 раза превышает смертность среди городского населения (13,6), в трудоспособном возрасте - соответственно, 16,9 и 45,8 случая.

Таким образом, категорией населения с наибольшими показателями смертности от случайных отравлений алкоголем являются мужчины в трудоспособном возрасте среди сельского населения - за 2019 г. - 69,8 случаев на 100 000 населения.

Доля алкогольных напитков и табачных изделий в структуре потребительских расходов домашних хозяйств в городах и посёлках городского типа (на 2018 год) составляла 2,8 %, в сельских населённых пунктах - 3,7 %. 20 % наиболее обеспеченных семей тратили на указанные товары в среднем 3,5 % расходов, 20 % наиболее обеспеченных - 2,7 % [2].

Смертность от случайных отравлений алкоголем является одним из лучших индикаторов социально-экономической ситуации в регионе, таким образом, можно говорить о тенденциях ухудшения ситуации в соответствующей сфере Белоруссии с 2015 года.

Источники и литература

- 1) Естественное движение населения по Республике Беларусь за 2019 год. Минск, 2020.
- 2) Толстоногова А. К. Тенденции алкоголизации и наркотизации в Беларуси и их региональные особенности // Творчество молодых, 2020: сборник научных работ студентов, магистрантов и аспирантов. Ч. 1. Гомель, 2020. С. 112–116.

3) World Health Organization: <https://apps.who.int/gho/data/node.main.A1036>

Иллюстрации




Рис. 1. Динамика смертности от случайных отравлений алкоголем в Белоруссии, 1990–2019 гг., число случаев на 100 000 человек населения