

Секция «Клиническая психология (патопсихология, психосоматика и психология телесности)»

Сравнение восприятия теста Роршаха и параллельной серии теста Бена-Роршаха на российской выборке условной нормы

Научный руководитель – Рупчев Георгий Евгеньевич

Телицына Юлия Вадимовна

Студент (специалист)

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, Факультет психологии, Кафедра нейро-и патопсихологии, Москва, Россия

E-mail: telitsyna02@list.ru

Исследователям известно, что ценность данных повышается, если методика проводится в динамике. Возникают ситуации, когда и проективные методики (тест Роршаха) необходимо провести повторно. Сам Г.Роршах говорил о необходимости создания параллельной серии чернильных пятен, которые можно было бы дать испытуемому в качестве ре-теста. Потребность в параллельных сериях велика при тестировании людей в различном психическом состоянии, до и после терапевтических процедур в обстоятельствах, когда «сознательная или бессознательная память может повлиять на результат» (Singer J. L., 1952).

В 1920 году Г. Бен-Эшенбург под руководством Роршаха, разработал серию из 10 пятен, которые, по своей конструкции, были очень похожи на оригинальный тест (основные отличия включают в себя меньший размер серии Бена, отличия по яркости и насыщенности цвета, также пятна Бена более четко разделены на сегменты, и цвета в них меньше накладываются друг на друга (Eichler R., 1950) (Singer J. L., 1952)). По задумке Бена-Эшенбурга, эта новая серия должна была быть эквивалентной оригинальному тесту. Однако, только в 1941 году эта новая серия стала доступна для широкого использования, когда Zulliger написал руководство к ней (Zulliger, H., 1956). Несмотря на необходимость, как в научных исследованиях, так и в клинической практике, в параллельной серии теста, относительно небольшое количество исследований было посвящено сопоставлению этих двух методик, призванных быть эквивалентными друг другу. Однако, на российской выборке, апробации теста Бена-Роршаха не проводилось.

Целью исследования была апробация теста Бена-Роршаха на российской выборке и сравнение его результатов с тестом Роршаха.

Гипотеза заключалась в возможности использования теста Бена-Роршаха в качестве ре-теста к тесту Роршаха.

Выборку составили 8 человек, от 20 до 58 лет, 4 женщины и 4 мужчины. Все участники исследования не имеют психиатрических диагнозов и могут быть отнесены к условной норме.

Оба теста были проведены в соответствии со стандартом проведения (Ассанович, М.А., 2011), через средний интервал времени в 8 дней (от 2 до 14 дней) в соответствии с замечанием Zulliger (Singer J. L., 1952). Анализ протоколов проводился по интегративной системе Экснера. Чтобы получить представление о степени взаимосвязи между двумя тестами, в SPSS была проведена корреляция между показателями методик с использованием коэффициента корреляции Пирсона для расчёта уровня согласованности.

Были получены значимые корреляции по следующим детерминантам: FM ($r=0,799$, $p=0,009$), m ($r=0,893$, $p=0,001$), FY ($r=0,735$, $p=0,019$), FV ($r=0,866$, $p=0,003$), Fr ($r=0,67$, $p=0,034$), F ($r=0,886$, $p=0,002$);

по содержаниям: Hd ($r=0,766$, $p=0,013$), Cg ($r=0,808$, $p=0,008$), Xy ($r=0,882$, $p=0,002$), id ($r=0,835$, $p=0,005$);

по следующим особым показателям: DV ($r=0,655$, $p=0,039$), DR ($r=1$, $p<0,00001$), FAB ($r=0,0745$, $p=0,017$), AB ($r=0,696$, $p=0,028$), AG ($r=1$, $p<0,00001$), COP ($r=0,798$, $p=0,009$), MOR ($r=0,937$, $p=0,0003$).

По остальным детерминантам, содержаниям и особым показателям корреляции были незначимые. Такие показатели, как уровень формы и локализация в данной работе мы не рассматривали.

Выводы: результаты согласуются с полученными Acklin [2] и Singer [5]. Серии тестов вызывают в целом сходные реакции у испытуемых (особенно это касается детерминант и особых показателей, не относящихся к так называемой «критической шестерке»; чтобы обсуждать результаты корреляции по показателям «критической шестерки» необходимо в дальнейшем провести исследование на клинической выборке), однако их нельзя назвать эквивалентными.

Предварительно, тест Беро может быть ре-тестом для теста Роршаха по некоторым детерминантам.

Источники и литература

- 1) Ассанович, М.А. (2011). Интегративная система психодиагностики методом Роршаха. М.: Когито-Центр.
- 2) Acklin M. (2024). The Parallel Series – The Behn–Rorschach Inkblot Test. *Rorschachiana*. 45, 104-117. DOI: 10.1027/1192-5604/a000175
- 3) Eichler R. (1950). A Comparison Of The Rorschach And Behn-Rorschach Inkblot Tests, 185-189, State University Of Iowa
- 4) Schwartz F, Kates Sl. (1957). Behn-Rorschach under standard and stress conditions. *J Consult Psychol*, 21:4, 335-338, DOI: 10.1037/h0041980
- 5) Singer, J. L. (1952). The Behn-Rorschach Inkblots: A Preliminary Comparison with the Original Rorschach Series. *Journal of Projective Techniques*, 16:2, 238-245, DOI: 10.1080/08853126.1952.10380423
- 6) Zulliger, H., Gasson, J. A., & Curran, C. A. (Charles A. (1956)). The Behn-Rorschach test [U+202F]: text. Verlag Hans Huber.